



Dr AFRIAT Philippe

MEDECINE DU SPORT

Diplômé de biologie et médecine du sport
Diplômé de cardiologie du Sport
Diplômé de traumatologie du Sport
Diplômé de Médecine subaquatique et hyperbare
Echographie de l'appareil locomoteur

CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ DES PATIENTS POUR INJECTION DE PRP ou PRP/AH SOUS ÉCHOGRAPHIE

Madame, Monsieur,

Vous allez prochainement bénéficier d'une injection de PRP sous contrôle échographique. Elle sera pratiquée avec votre consentement; vous avez en effet la liberté de l'accepter ou de la refuser. Une information vous a été fournie sur le déroulement de celle-ci et de ses suites. N'oubliez pas de respecter les recommandations qui vous ont été faites.

Comment va se dérouler l'injection? :

Dans un premier temps un prélèvement d'une petite quantité de sang (un seul tube) vous est effectué. Puis votre sang est immédiatement centrifugé pendant une dizaine de minutes. Ensuite le médecin va extraire le PRP d'un kit spécial fourni par le laboratoire REGENLAB, enregistré aux normes CE en vigueur, et ce PRP vous sera injecté sur le site à traiter.

L'injection se déroule dans un environnement stérile, dans une salle dédiée à cet effet.

Le médecin effectue un lavage chirurgical des mains, il porte un masque et des gants stériles, il utilise des matériels d'injection stériles, également un gel stérile pour réaliser le guidage échographique de l'aiguille dans le tissu.

L'utilisation de l'échoguidage permet de suivre en temps réel le déroulement de l'intervention mais aussi d'éviter les organes nobles. Ainsi seront diminués les risques de complications (saignement, infection, lésion neurologique...).

Les précautions:

Il est nécessaire de signaler au médecin toute fièvre, infection quelconque, toute lésion cutanée, toute prise d'aspirine et / ou anticoagulants dans les jours précédents l'injection, ainsi que toute allergie aux médicaments.

De plus il faut signaler toute maladie du sang, saignements fréquents ou prolongés (du nez par exemple).

Il est nécessaire de ne pas venir à jeun le jour de l'injection.

Les réactions possibles:

Une douleur peut survenir dans les heures qui suivent l'injection: il est alors

L'Athos Palace



Dr AFRIAT Philippe

MEDECINE DU SPORT

Diplômé de biologie et médecine du sport
Diplômé de cardiologie du Sport
Diplômé de traumatologie du Sport
Diplômé de Médecine subaquatique et hyperbare
Echographie de l'appareil locomoteur

possible de prendre un antalgique qui vous sera prescrit de façon systématique, ainsi qu'une attelle d'immobilisation à utiliser pendant quelques jours. N'appliquez pas de glace sur la zone.

Une infection ou un saignement avec hématome restent des complications possibles mais rares malgré toutes les précautions prises. En cas de fièvre ou de douleur persistante contactez nous rapidement.

Le suivi :

Une consultation de contrôle avec échographie vous sera réalisée 15 jours plus tard, pour évaluer le processus de cicatrisation et guider le programme de réhabilitation à suivre.

Vous conserverez une copie de ce document dans un délai d'un an à compter de ce jour en cas de complication à distance.

Le Dr AFRIAT/ BENCHORTANE / NICOLA/ LOTITO m'a donné des informations précises sur les problèmes de santé qui motivaient la réalisation d'une injection de PRP et il m'a expliqué de façon claire et intelligible le déroulement de cet acte, le but recherché et les effets secondaires possibles pendant et après l'injection. J'ai eu la possibilité de poser des questions et les réponses ont été complètes et satisfaisantes.

Je donne mon consentement pour que soit réalisée l'injection dans les conditions ci-dessus

MONACO le:

Nom et signature du patient ou du tuteur légal:

L'Athos Palace

2 rue de la Lujerneta
98000 Monaco

+377/ 92.05.76.01
fax +377/ 97.77.86.01

afriat-cmim@monaco.mc
www.drafriat.com
www.cliniquemonaco.com